D-A-D 型色素の種重合と蛍光イメージング

(名大院理¹・名大 ITbM²) ○大城宗一郎¹・今井芳樹¹・山口茂弘^{1,2}

Seeded polymerization of D-A-D-type dyes and its fluorescence imaging (¹Graduate School of Science, Nagoya University, ²Institute of Transformative Bio-Molecules, Nagoya University) ○Soichiro Ogi,¹ Yoshiki Imai,¹ Shigehiro Yamaguchi^{1,2}

Fluorescence imaging is an effective way for understanding dynamics of molecular assembly. In this study, we designed and synthesized a diamide-functionalized D-A-D-type fluorescent dye for imaging of seeded supramolecular polymerization. We confirmed that spontaneous self-assembly in 1,2-dichloroethane was proceeded with a lag time, during which supramolecular polymers with controlled length could be produced using a seeding method. Fluorescence imaging allowed us to directly observe the growth of the supramolecular polymers from the termini of the seeds on a glass substrate.

Keywords : Supramolecular chemistry, Supramolecular polymer, Metastable state, Seeded supramolecular polymerization, Fluorescence imaging

超分子ポリマーの構造を精密に制御する上で、重合過程を速度論的に制御する種重合が有用である。種重合の詳細な機構の解明により、均質な機能性材料の創出につながるかと期待される。そこで本研究では、分子集合体のダイナミクス研究において有効な蛍光イメージングに着目し、基板上における種重合過程のライブイメージングに取り組んだ。

自己集合を促すアミノ酸ジアミド基を導入した D-A-D 型色素 **1** を設計、合成し、種々のスペクトル測定により集合特性を評価した (Figure 1a)。1,2-ジクロロエタン中、**1** の超分子重合過程において、自発的な集合が一時的に抑制された誘導期が観測された。本挙動は、ジアミド部位の分子内水素結合により、速度論的に準安定な折りたたみ構造が形成されたことを示唆する¹⁾。得られた準安定状態の溶液を、集合体の断片(種)を散布した基板上に

添加し、顕微鏡観察を行なったところ、時間の経過とともに種の両末端から超分子ポリマーが伸長する様子が観察された (Figure 1b)。本発表では、D-A-D 型色素 **1** の光物性と集合特性、種重合の蛍光イメージングから得られた知見について発表する。

Figure 1. (a) Chemical structure of **1** and (b) fluorescence imaging of seeded polymerization.

1) S. Ogi, K. Matsumoto, S. Yamaguchi, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, 57, 2339–2343.