外部磁場印加によるカルバゾール含有発光体からの磁気円偏光発光(MCPL)

(¹近畿大・²北海道大・³奈良先端大)

○黒田 拓未¹・北原 真穂¹・戸田 隼人¹・三嶋 康平¹・木元 隆裕¹・王 慶宇²・中野 環²・藤木 道也³・今井 喜胤¹

Magnetic circularly polarized luminescence (MCPL) from carbazole-containing luminescent material by applying an external magnetic field

(¹Kindai University, ²Hokkaido University, ³NAIST)

○Takumi Kuroda,¹ Maho Kitahara,¹ Hayato Toda,¹ Kouhei Mishima,¹ Takuhiro Kimoto,¹ Qingyu Wang,² Tamaki Nakano,² Michiya Fujiki,³ Yoshitane Imai¹

In this work, magnetic circularly polarized luminescence (MCPL) from carbazole-containing luminescent materials, which are well known as TADF materials, was studied by applying an external magnetic field. It was found that 4CzIPN and TCTI which are carbazole-containing luminescent materials can emit MCPL at room temperature.

Keywords: Magnetic circularly polarized luminescence (MCPL); Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF); Carbazole; Chiral; Luminophore

近年、発光材料として熱活性化遅延化蛍光 (Thermally Activated Delayed Fluorescence, TADF)材料の開発が学術的、工業的観点から注目されている。そこでアキラルな TADF 材料を用い外部磁場印加による磁気円偏光発光 (MCPL)の発現が可能となれば、より高機能性の発光材料開発が可能になると考えられる。

本研究では、TADF 材料として有名なカルバゾール含有発光体を用い、外部磁場印加による MCPL の発現を試みた。

カルバゾール含有 TADF 発光体である 4CzIPN に外部磁場を印加し MCPL 特性について検討した(Fig. 1)。その結果、

極大 MCPL 波長 $\lambda_{MCPL} = 530 \text{ nm}$ で MCPL の発現に成功した。同様にカルバゾール含有 TADF 発光体である TCTI に外部磁場を印加し MCPL 特性について検討した(Fig. 2)。その結果、 $\lambda_{MCPL} = 470 \text{ nm}$ で MCPL の発現に成功した。

参考：ChemLett., 2021, 50, 1131-1141.

Fig. 1 MCPL (upper) and MPL (lower) spectra of (N→S)-4CzIPN (blue) and (S→N)-4CzIPN (green) in Chloroform (Conc. = $1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$).

Fig. 2 MCPL (upper) and MPL (lower) spectra of (N→S)-TCTI (blue) and (S→N)-TCTI (green) in Chloroform (Conc. = $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$).