分子内檜山カップリングを基盤とした 1,8,13 位異種置換トリプチセンの合成

(九大院総理工¹・九大先導研²) ○花田 将人¹・熊谷 智¹・岩田 隆幸²・新藤 充²
 Synthesis of triptycenes having different functional groups at 1,8,13 positions based on intramolecular Hiyama coupling (¹*Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University*, ²*Institute for Materials Chemistry and Engineering, Kyushu University*)
 ○Masato Hanada,¹ Satoru Kumagai,¹ Takayuki Iwata,² Mitsuru Shindo²

Triptycenes are propeller-shaped aromatic compounds which are often utilized as building blocks for functional organic materials. We have recently reported synthesis of 1,8,13-trisilyltriptycenes via triple cycloaddition of benzynes to ynolate. In this presentation, we will present the synthesis of triptycenes with different functional groups at 1,8,13-positions based on the intramolecular Hiyama coupling reactions.

Keywords : *Triptycene, Hiyama coupling, Intramolecular reactions, Silyl group*

トリプチセンは3つのベンゼン環が縮環したプロペラ型分子であり、超分子化学や機能性材料分野などでよく利用されている。発表者らは最近、イノラートとベンザインの3連続環化付加反応を用いた新規トリプチセン合成法を見出し¹、1,8,13-トリシリルトリプチセン**1**の位置選択的合成に成功した²。本研究では、これらシリル基を足がかりとして、トリプチセンの1,8,13位への異なる置換基の導入を検討した。

トリプチセン**1**から調製したブロモトリプチセン**2**に対して、塩基性条件下パラジウム触媒を作用させると、シリル基上のメチル基がトリプチセンの1位へ転位した架橋シリルエーテル**3**が得られた。この反応について重水素化標識実験などを用いて精査したところ、本反応は分子内檜山カップリング反応であることが判明した。さらに、得られた架橋トリプチセン**3**の2つのシリル基の反応性の違いを利用して、種々の1,8,13位異種置換トリプチセンへと変換することに成功した。

(1) Umezu, S.; Gomes, G. P.; Yoshinaga, T.; Sakae, M.; Matsumoto, K.; Iwata, T.; Alabugin, I.; Shindo, M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 1298. (2) Yoshinaga, T.; Fujiwara, T.; Iwata, T.; Shindo, M. *Chem. Eur. J.* **2019**, *25*, 13855.