イソキサゾールの脱芳香族化を伴う触媒的不斉環化付加反応の開発

(東工大院生命理工¹・東工大化生研²) ○伊藤 暖¹・盛田 大輝^{1,2}・中村 浩之^{1,2}
 Palladium-Catalyzed Asymmetric Dearomative Cycloaddition of Isoxazoles (¹ *School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology*, ² *Laboratory for Chemistry and Life Science, Tokyo Institute of Technology*) ○Non Ito,¹ Taiki Morita,^{1,2} Hiroyuki Nakamura^{1,2}

Isoxazoles and their dearomatized derivatives, isoxazolines, are highly important heterocycles in medicinal chemistry. Although various synthetic approaches have been reported for synthesis of functionalized isoxazolines, asymmetric dearomatization of isoxazoles has not yet been developed.¹ Herein, we report palladium-catalyzed asymmetric dearomative cycloadditions of isoxazoles with a variety of zwitterionic π -allyl palladium species generated from vinyl compounds.² After screening of reaction conditions, highly enantioselective cycloaddition of 4-nitroisoxazole **1** with vinyl ethylene carbonate (**2**) was achieved. The reactions proceeded under mild conditions to afford novel bicyclic isoxazolines with high enantioselectivities (>99% ee). This synthetic approach was applicable to other π -allyl palladium species, and various bicyclic isoxazolines were able to be synthesized.

Keywords : Isoxazole, Isoxazoline, Dearomatization, Asymmetric Cycloaddition, Palladium Catalyst

ヘテロ芳香族化合物であるイソキサゾールや、その部分還元体のイソキサゾリンは生物活性物質として重要な複素環化合物である。しかし、イソキサゾリンの合成法として、イソキサゾールの不斉脱芳香族化反応はほとんど報告されていない¹⁾。そこで我々は、近年ヘテロ芳香族化合物の不斉脱芳香族化反応に利用されている π -アリルパラジウム種に焦点を当て²⁾、これの前駆体となるビニル化合物と、パラジウム触媒および不斉配位子を用いることで、イソキサゾールの脱芳香族化を伴う不斉環化付加反応の開発を目指した。

実際に、不斉配位子として(*S*)-DTBM-SEGPHOS を用い、パラジウム触媒存在下で4-ニトロイソキサゾール **1** とビニルエチレンカルボナート(**2**)を反応させると、脱芳香族化を伴う環化付加反応が低温下で円滑に進行し、ほぼ完全なエナンチオ選択性(>99% ee) で二環性イソキサゾリン **3** および **4** が得られた。本発表では、本反応の基質適用範囲に加え、他の π -アリルパラジウム種との反応も併せて報告する。

1) Liu, H.; Yan, Y.; Zhang, J.; Liu, M.; Cheng, S.; Wang, Z.; Zhang, X. *Chem. Commun.* **2020**, 56, 13591.

2) Zheng, C.; You, S. L. *ACS Cent. Sci.* **2021**, 7, 432.