SrTaO₂N を用いた各種電子受容体水溶液からの酸素生成反応の検討

(信大院工¹・信大先鋭材料研²・JST さきがけ³) ○平子秋生¹・大槻丈碩¹・久富隆史^{2,3}・堂免一成²

Study on oxygen evolution reactions using SrTaO₂N from aqueous solutions of various electron acceptors (¹Graduate School of Engineering, Shinshu University, ²Research Initiative for Supra-Materials, Shinshu University, ³PRESTO, Japan Science and Technology Agency) ○ Akio Hirako¹, Takehiro Otsuki¹, Takashi Hisatomi^{2,3}, Kazunari Domen²

CoO_x-loaded SrTaO₂N single-crystal particles exhibit high oxygen evolution activity from AgNO₃ aqueous solution. In this study, the oxygen evolution activity of SrTaO₂N from various electron acceptor aqueous solutions was investigated toward the application of SrTaO₂N to the Z-scheme system. Oxygen was evolved from Na₂S₂O₈ aqueous solution when reduction and oxidation cocatalysts were coloaded, but the rate was 1/80 that from AgNO₃ aqueous solution. In addition, oxygen was not evolved from NaIO₃ and K₃[Fe(CN)₆] aqueous solutions. Photoelectrochemical measurements of CoO_x-loaded SrTaO₂N showed that the cocatalyst promoted the oxygen evolution reactions. This result suggests that the reduction of the electron acceptors other than AgNO₃ was difficult to occur on cocatalyst-loaded SrTaO₂N.

Keywords : Oxynitride, cocatalyst, coloaded

CoO_xを担持した SrTaO₂N 単結晶微粒子は AgNO₃ 水溶液から高効率に酸素を生成する¹⁾。この材料を Z スキーム型水分解の酸素生成光触媒に用いることができれば高い STH が期待できる。そこで本研究では、SrTaO₂N の Z スキーム系への応用を目指し、各種電子受容体水溶液からの酸素生成活性を検討した。また、助触媒の酸化反応への影響を光電気化学測定により調べた。

フラックス法で合成した SrTaO₂N に CoO_x を含浸法で担持した。その後、還元助触媒として Pt, Rh, Au, Ir を含浸法又は光電着法を用いて共担持した。得られた SrTaO₂N に対して可視光を照射し、AgNO₃、Na₂S₂O₈、NaIO₃、K₃[Fe(CN)₆] 水溶液からの酸素生成活性を測定した。助触媒を共担持すると Na₂S₂O₈ 水溶液から酸素が生成したが、AgNO₃ 水溶液の場合の 80 分の 1 の速度であった。また、NaIO₃、K₃[Fe(CN)₆] 水溶液からは酸素を生成しなかった。また、NaIO₃、K₃[Fe(CN)₆] 水溶液からは酸素を生成しなかった。

CoO_x が酸素生成助触媒として機能しているかを確かめるため、粒子転写法を用いて SrTaO₂N 光電極を作製し、pH=13 における光アノード電流を測定した。CoO_x の担持により光電流開始準位は卑な電位にシフトした(図 1)。したがって、AgNO₃ 以外の電子受容体を用いた時は、電子受容体の還元が起こりにくいために酸素生成活性が低かったと考察した。

図 1 SrTaO₂N(a)、CoO_x/SrTaO₂N(b) の電流・電位曲線

1) 平子ら, 日本化学会第 102 春季年会, B304-3pm-16 (2022)