

駿河湾における富士山からの海底湧出地下水（VI）

Submarine groundwater discharge from Mt. Fuji in Suruga Bay(VI)

*村中 康秀¹、神谷 貴文¹、伏見 典晃¹、岡 智也¹、小野 昌彦²、丸井 敦尚²

*Yasuhide Muranaka¹, Takafumi Kamitani¹, Noriaki Fushimi¹, Tomoya Oka¹, Masahiko Ono², Atsunao Marui²

1. 静岡県環境衛生科学研究所、2. 産業技術総合研究所

1. Shizuoka Institute of Environment and Hygiene, 2. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

富士山周辺では、透水性に富む玄武岩質の新富士溶岩が主要な地下水の流路になっている。特に富士山南西麓では、富士川河口断層が南北方向に分布しており、この断層が駿河湾への地下水流動に大きな影響を与えている可能性がある。また、富士山にもたらされた降水が駿河湾で海底湧出地下水となって湧出し、沿岸海域の生物資源に影響を与えていると考えられる。

本研究では、駿河湾の豊かな沿岸生態系の解明への貢献を目指し、奥駿河湾において海底湧出地下水調査を実施した。断層がある富士川河口周辺から深さ100~200mに新富士溶岩が分布する富士川~田子の浦間の奥駿河湾において、これらの推定された場所を対象に、遠隔操作無人探査機（ROV）を使用して海底の状況を把握するとともに、海底湧出地下水を高い割合で含むサンプルを採取して水質分析を実施した。本発表ではこれらの取り組みについて紹介する。

キーワード：海底湧出地下水、富士山、遠隔操作無人探査機、採水法

Keywords: submarine groundwater discharge (SGD), Mt. Fuji, remotely operated vehicle (ROV), water sampling method