一重項ビラジカル分子 Ph₂-IDPL を用いた 両極性有機電界効果トランジスタの作製

Fabrication of ambipolar organic field-effect transistors with delocalized singlet biradical Ph₂-IDPL film

東理大¹, 産総研², 阪大院・理³

○古池 晴信¹, 近松 真之², 阿澄 玲子², 小川 一道¹, 久保 孝史³, 金井 要¹

Tokyo Univ. of Science¹, AIST², Osaka Univ.³, ○Harunobu Koike¹, Masayuki Chikamatsu²,

Reiko Azumi², Kazumichi Ogawa¹, Takashi Kubo³, Kaname Kanai¹

E-mail: j6212607@ed.tus.ac.jp

有機電界効果トランジスタ(OFET)の高移動度化には、バンド伝導を生かした OFET の作製が必要不可欠である。一重項ビラジカル分子 Ph₂-IDPL (diphenyl derivative of *s*-indacenodiphenalene)は、安定な非局在形一重項ビラジカル種であり、分子の両端にあるフェナレニルラジカル由来の構造を用いて、非常に強い分子間相互作用を実現している(図 1)。そのため結晶中では、一次元的な分子鎖を組みエネルギーバンド構造を発達させることが分かっている^[1]。本研究では、この Ph₂-IDPL のエネルギーバンド構造の発達を生かした高移動度の OFET の作製を目的とした。また、Ph₂-IDPL は、真空蒸着法において非晶質の薄膜を形成することが知られている。この時、Ph₂-IDPL は、小さな HOMO-LUMO ギャップにより両極性が得られることが報告されている^[2]。このことから、Ph₂-IDPL を結晶化させることが出来れば、HOMO および LUMO のエネルギーバンド構造が発達し、より高い両極性移動度を得ることが期待される。本研究では、ガス中蒸発法を用いることで Ph₂-IDPL 薄膜を結晶化させ、それを OFET に応用した。そして、真空蒸着法の時よりも高い移動度を得る事に成功した(図 2)。また、蒸着条件や基板の処理等を変えることで、Ph₂-IDPL は様々な結晶性の薄膜を作ることが明らかになった。講演では、OFET 特性と X 線回折(XRD)や原子間力顕微鏡(AFM)の結果を比較することで、薄膜の構造と移動度の関係について議論する。

^[1] H. Koike *et al.*, *Appl. Phys. Lett.*, **102**, 134103 (2013),

^[2] M.Chikamatsu *et al.*, *Appl. Phys. Lett.*, **91** 043506 (2007)

図 1. 結晶中での Ph₂-IDPL の分子構造

図 2. Ph₂-IDPL を用いた両極性 OFET の I_d - V_g 特性