Ag(111)表面上シリセン $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ R13.9°相の構造決定

Structure determination of silicene $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ R13.9° phase on Ag(111) surface

東大新領域¹, 東大物性研²

○齋押 慶祐¹, 馮 凌瑜¹, 小野田 穰¹, 福田 将大², 尾崎 泰助², 杉本 宜昭¹

GSFS, Univ. of Tokyo¹, ISSP, Univ. of Tokyo²

○Keisuke Yabuoshi¹, Lingyu Feng¹, Jo Onoda¹, Shota Fukuda², Taisuke Ozaki², Yoshiaki Sugimoto¹

E-mail: kyabuoshi@afm.k.u-tokyo.ac.jp

シリセンは Si 原子が 2 次元ハニカム状に配列した層状物質である。理論計算によってシリセンが量子スピンホール効果を発現しうることが示されており[1]、2次元トポロジカル絶縁体の候補として注目を集めている。シリセンは Ag(111)表面上に作製されることが多く、その構造は低速電子回折(LEED)や走査トンネル顕微鏡(STM)によって調べられてきた。Ag(111)上シリセンは Si 原子の配置の違いによって 4×4 相、 $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ R13.9°相、 $4/\sqrt{3}\times 4/\sqrt{3}$ 相など、さまざまな構造をとることが知られている[2]。近年、我々のグループは原子間力顕微鏡(AFM)を用いて 4×4 相の高分解能観察を行い、得られた AFM 像が提唱されている構造モデルとよく一致することを確認した[3]。

本研究では、AFM と密度汎関数理論(DFT)による計算によって、Ag(111)上シリセンの $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ R13.9°相(以下、単に「 $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ シリセン」)の構造モデルを提唱した。AFM 観察の結果、 4×4 相の場合と同様に単位胞内のすべての Si 原子を画像化することに初めて成功した。また得られた AFM 像によって、Si 原子のバックリングが異なる 2 種類の構造が存在することが判明した。そこで、DFT に基づいた計算によりそれぞれの構造モデルを構築し、それらが AFM 像と一致することを確認した。以上の結果から、1 種類だと考えられていた $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ シリセンが、実際は 2 種類存在することが明らかになった。

Fig. 1. 2 種類の $\sqrt{13}\times\sqrt{13}$ シリセンの AFM 像と、それぞれに対応する DFT 計算によって得られた構造モデル。バックリングの違いによって、同じ位置にある Si 原子の高さが異なっている。

[1] C.-C. Liu *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **107**, 076802 (2011).

[2] B. Feng *et al.*, *Nano Lett.* **12**, 3507 (2012).

[3] J. Onoda *et al.*, *Phys. Rev. B* **96**, 241302(R) (2017).