(C₆H₅C₂H₄NH₃)₂Pb_{1-x}Ca_xBr₄ 有機無機複合単結晶のシンチレーション特性
Scintillation properties of (C₆H₅C₂H₄NH₃)₂Pb_{1-x}Ca_xBr₄ organic-inorganic compound
single crystal

奈良先端大¹, 秋田大² ◯赤塚 雅紀¹, 河野 直樹², 河口 範明¹, 柳田 健之¹

NAIST¹, Akita Univ.², ◯Masaki Akatsuka¹, Naoki Kawano²,

Noriaki Kawaguchi¹, Takayuki Yanagida²,

E-mail: akatsuka.masaki.ad5@ms.naist.jp

シンチレータは蛍光体の一種であり、X線等の keV~GeV オーダーの高エネルギー放射線を吸収し、蛍光を発する機能性材料である。シンチレータには気体、液体、固体と様々な種類があり、その中でも固体シンチレータは有機と無機シンチレータに分けられる。いずれのシンチレータも特徴やメリットがあり、用途に応じて使い分けられる。近年、有機無機複合ペロブスカイト型化合物が二次元量子ナノ構造を形成し、量子閉じ込め効果により高強度で高速な発光を示す[1]ことから注目が集まっているが研究報告例は少ない。本研究では有機無機ペロブスカイト型化合物である(C₆H₅C₂H₄NH₃)₂Pb_{1-x}Ca_xBr₄に着目し、単結晶を品溶媒拡散法で育成し、フォトルミネッセンス、シンチレーション特性を調べた。

Figure 1 に(C₆H₅C₂H₄NH₃)₂Pb_{1-x}Ca_xBr₄の X線誘起シンチレーション発光スペクトルを示す。440 nm 付近に発光ピークが観測され、起源は自由励起子によるものだと考えられる。また Figure 2 に示すように、シンチレーション減衰曲線は 3 成分の自然対数曲線で近似できた。一番速い成分は約 10 ns であり、既報より無機層における励起子の再結合だと考えられる[1]。また第二、第三の成分は浅いトラップに捕獲された励起子の再結合によるものだと考えられる。本講演では基礎的な光学特性及びシンチレーション特性の Pb と Ca の濃度依存性に関して報告する。

Figure 1. X-ray induced scintillation spectrum of (C₆H₅C₂H₄NH₃)₂Pb_{0.95}Ca_{0.05}Br₄.

Figure 2. X-ray induced scintillation decay time of (C₆H₅C₂H₄NH₃)₂Pb_{0.95}Ca_{0.05}Br₄.

[1] N. Kawano, M. Koshimizu, G. Okada, Y. Fujimoto, N. Kawaguchi, T. Yanagida, K. Asai, Sci. Rep. **7**, (2017) 14754.