Nd₂CuO₄における 3d/4f 局在電子軌道の第一原理有効ハミルトニアン of Nd₂CuO₄Theoretical determination of a first-principles effective Hamiltonian of Nd₂CuO₄(B)玉垣侑也¹⁾, 草部浩一^{1,2)}, (D)寺西慎伍²⁾, (P)西口和孝³⁾(B)Yuya Tamagaki¹⁾, Koichi Kusakabe^{1,2)}, (D)Shingo Teranishi²⁾, (P) Kazutaka Nishiguchi³⁾¹⁾School of Engineering Science, Osaka University,²⁾Graduate School of Engineering Science, Osaka University,³⁾Graduate School of Science, Technology, and Innovation, Kobe University

E-mail: tamagaki@artemis-mp.jp

層状銅酸化物には、CuO₂ 構造の強相関電子状態に起因する磁性と超伝導に興味を持たれてきた。が、バッファ層の電子状態の理解が、多様な応用を目指す際にも、高温超伝導の機構解明にも重要である。そこで電子ドープ系を与えると同時に NdO 構造に起因する 4f 電子磁性が発生する Nd₂CuO₄ に着目する。

第一原理的な有効電子モデルを Nd₂CuO₄(Fig.1)に対して決定すると Nd の f 準位の平均場軌道エネルギーが有効ポテンシャルの作成方法に強く依存する。そこで、(1) LDA 法、(2) LSDA 法、(3) LDA+U 法を適応し複数の第一原理有効強結合モデルを導いた。(3) の LDA+U 計算では、Hubbard U 項を Nd の f 軌道に設定し、Cu 上の電子相関は強結合モデルを決定した後に明示的に考慮するスピン揺らぎ理論の強結合モデル決定方法¹⁻³⁾に準拠した。

Fig.1 The crystal structure of Nd₂CuO₄

3つの方法でそれぞれ Cu の $d_{x^2-y^2}$ と d_z^2 軌道のワニエ関数を、Nd の f 軌道と同時に決定した。結果を Fig.2 に示す。

(1) LDA 法 :

2本の f 軌道がフェルミエネルギー付近に存在する。

(2) LSDA 法 :

f 軌道のエネルギーがスピン分裂し、f 軌道はフェルミエネルギー付近から離れている。

(3) LSDA+U 法の場合 :

f 軌道はすべてフェルミエネルギー付近に存在している。

Fig. 2 Band structures of Nd₂CuO₄ by several simulation methods

さらに、次の点を結論した。i) LSDA 法の結果は Nd 上の局所磁化を与えるが、配位子場効果にも影響され f 軌道におけるエネルギー分裂が起こる。ii) LSDA+U 法のフェルミエネルギー付近に存在する f 軌道は Cu の $d_{x^2-y^2}$ 軌道との相互作用が強いことを示唆する。iii) 軌道決定方法の選択の時点で、異なった Nd の f 軌道の物理的な性質が見られた。従って、強相関超伝導を表現する Hubbard モデルの磁気多体解は、f スピン系の磁気状態の決定を同時にかつ自己無撞着に行う必要がある、と考えることができる。

参考文献(1) S.W. Jang, *et al.*, *Sci. Rep.* **6**, 33397 (2016). (2) K. Nishiguchi, *et al.*, *Phys. Rev. B* **98**, 174508 (2018). (3) S. Teranishi, *et al.*, *J. Phys. Soc. Jpn.* **87**, 114701 (2018).