酸水素化物 EuVO_2H における圧力誘起サイト間電荷移動

Pressure-induced intersite charge transfer in oxyhydride EuVO_2H

京大工¹ [○](D)難波 杜人¹, 高津 浩¹, 三木田 梨歩¹, Haobo Li¹, (M1)村山 寛太郎¹,
(B)寺田 凌¹, 陰山 洋¹

Kyoto Univ.¹, [○]Morito Namba¹, Hiroshi Takatsu¹, Riho Mikita¹, Haobo Li¹, Kantaro Murayama¹,
Ryo Terada¹, Hiroshi Kageyama¹

E-mail: kage@scl.kyoto-u.ac.jp

圧力や温度により、異なるサイトを占めるイオン間で電荷のやり取りが行われる現象をサイト間電荷移動と呼ぶ。いくつかのペロブスカイト型酸化物において、このサイト間電荷移動が巨大な負の熱膨張や金属絶縁体転移といった興味深い現象を伴うことが報告されており、大きな注目を集めている^[1,2]。特に金属絶縁体転移近傍の探索や物性の理解は、超伝導の発現やメカニズムの解明という観点から非常に重要である。

酸水素化物 SrVO_2H は約 50GPa の高圧下で金属絶縁体転移を起こすことが知られている^[3]。 SrVO_2H 中のヒドリドイオン (H^-) は一次元に秩序配列し $\text{trans-VO}_4\text{H}_2$ 八面体を形成している。 σ 対称な H 1s 軌道と π 対称な V t_{2g} 軌道が直交しているため V^{3+} における t_{2g} 軌道の縮退は一部解け、 $(d_{xz/yz})^2(d_{xy})^0$ という電子配置を取る。強い電子相関は $d_{xz/yz}$ バンドをさらに分裂させ、 SrVO_2H は擬二次元 Mott 絶縁体となる^[4]。しかしながら高圧下ではバンド幅が大きく広がり 3 つの t_{2g} 軌道が混合することによる金属化が起きてしまう。超伝導の発現にはバンドの次元性を制御することが望ましい。

我々は EuVO_3 の低温還元により SrVO_2H の Sr サイトを Eu に全置換した EuVO_2H を合成することに成功した。高圧下における XANES 測定により、約 15GPa 程度で Eu^{2+} から V^{3+} への電子移動 (Fig 1a,b) とそれに伴った金属化が起きることがわかった。 SrVO_2H の問題点であった軌道混合を解消した、二次元的なバンド状態を保った金属絶縁体転移が期待できる。発表では構造や物性の変化も交えた議論を行う予定である。

[1] Long, Y. W. et al. *Nature* **2009**, 458, 60–63.

[2] Azuma, M. et al. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 14433–14436.

[3] Yamamoto, T. et al. *Nat. Commun.* **2017**, 8, 1217.

[4] Denis Romero, F. et al. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 7556–7559.

Fig 1. (a) XAS at Eu L_3 -edge under various pressures. The dashed lines indicate the fitting functions. (b) Pressure dependence of the Eu^{2+} ratio in EuVO_2H .