ポスター

胎児心臓病③

座長:竹田津 未生 (旭川厚生病院)
Fri. Jul 17, 2015 1:50 PM - 2:26 PM ポスター会場 (1F オリオン A+B)
II-P-022～II-P-027
所属正式名称：竹田津未生(旭川厚生病院　小児科)

[II-P-026]当院における胎児心エコー検査の過去5年間のまとめ

○清水 信隆[1], 田中 優[1], 進藤 考洋[1], 平田 陽一郎[1], 犬塚 亮[1], 林 泰佑[2], 香取 竜生[3] (1.東京大学医学部付属病院　小児科,　2.国立成育医療研究センター　循環器科,　3.関東中央病院)

Keywords:胎児心エコー, 胎児診断, 予後

【目的】当院における胎児心エコー検査の現状を知ること。【方法】2009年1月から2014年12月に当院で胎児心エコーを施行した症例の診療録より、母体の特徴、疾患、転帰を後方視的に検討した。【結果】調査期間中に胎児心エコーを施行したのは255例430回。母体年齢は17-50歳（中央値32歳）、最初に胎児異常を指摘されたのは14-39週(中央値28週)、初回施行週数は17-39週（中央値30週）で、22週未満10例（4%）、37週以降17例(7%)であった。胎児心エコーの理由は、心奇形疑い205例(80%)、不整脈16例（6%）、他疾患の心スクリーニング30例(11%)、母体心疾患1例、前児心疾患1例であった。心奇形を疑われた205例の内、正常心は18例(9%)、TOFおよび PA/VSD、 IAA/CoA、 HLHSが多く、また18トリソミーが18例、13トリソミー6例であった。人工妊娠中絶を選択したのは2例、子宮内胎児死亡(IUFD)となったのは19例(7%)であった。他院での分娩を選択した31例を除き、205例が当院で分娩され、心疾患を理由に計画分娩とされたのは62例(30%)、出生後に要した処置は PGE1投与66例（32%）、 BAS 11例(5%)、緊急手術8例(4%)で、緊急手術の内5例は TAPVRであった。 over diagnosisも含めて胎児診断と生後診断が異なったのは34例(17%)で、8例が生後に CoA/IAAを認め、2例はCoAでなく IAAであった。 TAPVR 5例が生後に診断された。 IUFD19例に加え、生後7例、新生児周術期14例、遠隔期12例と計52例(20%)がすでに死亡していた。【まとめ】大動脈弓疾患、肺静脈疾患の胎児診断は依然難しい。 IUFD含めて胎児心エコー検査を行った20%が死亡するなど重症疾患が多く含まれており、胎児診断時より予後について慎重にご家族に説明する必要がある。

©Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery