ポスター | 2-02 体外循環・心筋保護

ポスター

体外循環①

座長: 平田 康隆 (東京大学医学部附属病院)

Sat. Jul 18, 2015 10:50 AM - 11:20 AM ポスター会場 (1F オリオン A+B)

III-P-149~III-P-152

所属正式名称: 平田康隆(東京大学医学部附属病院 心臓外科)

[III-P-149] Bridge to Recovery を目指した循環補助としての小児 ECMO の成績

○黒子 洋介, 笠原 真悟, 上野 洋資, 堀尾 直裕, 小林 順子, 樽井 俊, 川畑 拓也, 小谷 泰弘, 吉積 功, 新井 禎彦, 佐野 俊二 (岡山大学病院 心臓血管外科)

Keywords: ECMO, 心臓手術後, 術後管理

【背景】心臓手術で人工心肺離脱が困難な場合や術後に急変した場合、心筋炎などで循環が破綻した場合はやむを得ず ECMO を導入することになるが、その結果は決して満足できるものではない。当院では2005年より ECMO に対する治療方針を変更し、より積極的に ECMO を導入する、カテコラミンの使用を極力控える、などの改善を行ってきた。今回その結果を報告し、問題点とさらなる改善点について検討する。【方法および結果】1997年1月から2014年12月の間で、18歳以下の心臓手術後および心筋炎等で循環が破綻した患者に対し、ECMO を導入した症例は104名114例であり、10名の患者が2回 ECMO 導入となった。年齢は0~14歳で、中央値は77日であった。先行手術は姑息手術が66名、根治手術が23名であり、最も多かった術式は modified Norwood 手術で25名であった。導入理由は、人工心肺離脱困難37例(32%)、CPA33例(29%)、LOS26例(23%)、低酸素血症18例(16%)であった。ECMO 導入患者114例中68例(60%)が離脱に成功。35名が退院できた。ECMO 時間は離脱群で 175 ± 213 時間、死亡群で 393 ± 374 時間で、有意に離脱群で短かった。治療方針を変更した2005年以降では ECMO 離脱率72%(85例中61例)と、それまでの24%(29例中7例)に比べ、大幅な改善がみられた。【まとめ】ECMO の導入を積極的に行うこと、ECMO 中の管理について改善を重ねていくことで ECMO 導入による救命率は向上している。ECMO は小児心疾患患者術後における生命維持装置として有効な手段であると考えられ、現在では bridge to recovery として積極的に導入すべきと考える。