ガス相での複核錯体触媒を用いた CO₂ 水素化による低温メタノール合成

(産総研) ○姫田雄一郎

CO₂ hydrogenation to methanol catalyzed by multinuclear complexes in gas-solid phase reaction (AIST) Yuichiro Himeda

Methanol is in high demand as a fuel and bulk chemical. We report a novel approach for CO₂ hydrogenation to methanol in the gas-solid phase using multinuclear iridium complexes under mild conditions. The homogeneous CO₂ hydrogenation by piconlinamide based catalysts in water provided only a negligible amount of methanol. On the other hand, the reaction by dinuclear catalyst under gas-solid phase conditions led to the effective production of methanol without contamination with CO and CH₄. The catalytic activities of the dinuclear catalyst were dependent on the relative configuration of each active species. A final turnover number of 113 was obtained by reusing the catalyst at 60 °C and 4 MPa of H₂/CO₂ (3:1).

Keywords : Methanol; CO₂ hydrogenation; Dinuclear complex; Gas-solid phase reaction

カーボンニュートラル社会に向けて、二酸化炭素有効利用の技術開発が求められている。基礎化学品や燃料として年間約 1 億トン製造されているメタノールを CO₂ から合成する技術開発が進められている。しかし、従来の銅系触媒では 200 度以上の反応温度が必要であり、低い平衡転化率が問題であった。このため、カーボンリサイクル技術ロードマップ（経産省 2021 年 7 月改訂）では、メタノール合成において、反応低温化のための触媒開発が技術課題として挙げられている。

近年、錯体触媒を用いた CO₂ 水素化によるメタノール合成の開発が活発に行われている。¹⁾ これまでは、ギ酸アミドやエステル等を経由する間接合成法であった。最近、直接合成法が報告されるようになったが、添加物存在下有機溶媒中の反応であり、生成物の分離や触媒再利用が困難であった。

演者は、以前より CO₂ 水素化触媒の開発を行っている。²⁾ これまで、硫酸存在下、ギ酸を経由したメタノール合成を報告している。³⁾ しかし、CO₂ からギ酸への平衡制約により、メタノールの生成が限られていた。今回、複核錯体触媒を用いた気固反応で CO₂ 水素化反応による低温低圧条件下でのメタノールの合成を報告する。⁴⁾

CO₂ 水素化によるメタノール合成に向けてピコリンアミド配位子を持つ単核触媒(1)および複核触媒(2)を設計・合成した(図 1)。単核触媒(1)を、水中で均一系 CO₂ 水素化反応を行ったところ、ギ酸のみが生成した(図 2 a)。一方、複核触媒(2)では、(1)と同様にギ酸が主に生成したが、わずかにメタノールも生成した(図 2 b)。そこで、溶媒を用いないガス中での反応を試みた。触媒(1)では、生成物がほとんど検出され

図 1. CO₂ 水素化触媒

なかった (図 2 c)。一方、複核触媒(2)では、メタノールが選択的に生成し、 CH_4 や CO は検出されなかった (図 2 d)。さらに、メタノールは主に気相中に存在するために、容易に分離回収できるとともに、触媒の再利用可能であった。60 °C, 4 MPa ($\text{H}_2/\text{CO}_2=3:1$)の5サイクルで触媒回転数 113 回が得られた。さらに、0.5 MPa や 30 °C の温和な条件でもメタノールが生成した。

推定反応機構を図 3 に示す。まず、固体状態の錯体触媒と水素ガスが反応してヒドリド触媒(A)、ついで CO_2 との反応によりホルマト触媒(B)が生成する。ホルマト種は分子内ヒドリド移動により還元され、最終的にメタノールが生成したと考えている。

本技術では、錯体触媒の気固反応、複核触媒の組み合わせにより、温和な反応条件で CO_2 から選択的にメタノールを生成した。 CO_2 水素化触媒の新たな展開が期待できる。

参考文献

1. Onishi, N.; Himeda, Y., *Chem Catalysis* **2022**, j.checcat.2021.11.010.
2. Onishi, N.; Laurency, G.; Beller, M.; Himeda, Y., *Coord. Chem. Rev.* **2018**, 373, 317-332.
3. Sordakis, K.; Tsurusaki, A.; Iguchi, M.; Kawanami, H.; Himeda, Y.; Laurency, G., *Chem. Eur. J.* **2016**, 22, 15605-15608.
4. Kanega, R.; Onishi, N.; Tanaka, S.; Kishimoto, H.; Himeda, Y., *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, 143, 1570-1576.

図 2. CO_2 水素化による生成物：反応条件 4 MPa ($\text{H}_2/\text{CO}_2=3/1$), 60 °C, 1(9 μmol), 2(4.5 μmol)

図 3. 推定反応機構